01 14

Madeleine Céline

Vass4R08s061-065



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp653


dantadantadantad

Hadlens Store

Madeleine Céline
II 10 58 0

VI 10 58 Madeleine Celine





dontordortordortordortord








dintadantadantadantad





dontordoratordoratord

```
Madeleine Beline
DESIGNATION
CLOS TPLANCHE 10 RANG & SOUCHES
Vigueur : 1
PORT : (erig) - 1/2 érig - couché
Pédoncule : L - M)- C
Millerandage : 0
Date de Véraison :
Date de Maturité : 29 7-69 X
Pourriture : 0
\frac{\text{GRAPPE}}{\text{GRAPPE}} : G - (M) - P : L - (M) - C
BAIE : TG - G - M - P
        disc. - sph. - ell. - ov.
       obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb
              CHARGE :
s 1 f
s 2 8 (avec pépins - apyrène
s 3 } s 4 f
       JUS : (inc.) - coloré
$ 51
```

```
DESIGNATION Madeleine Céline
CLOS PLANCHE 10 RANG S SOUCHE 8
Vigueur : 1
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Pédoncule : (L)- M - C
Millerandage : 1
Date de Véraison : 10.7.70
Date de Maturité : 2977.70 1
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P
       disc. - sph. - ell. - ov.
       obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb
              CHARGE :
$ 24
       avec pépins - apyrène
s 4 p
       JUS : inc. - coloré
```

Année / 1968 II 1088 Désignation Madeleine Celine

	! Nomb	re	!		Date	3	
	to	tal	6.3	1 18/3			1
1	2	×	111				-
2 8	1		i	!\/ !			i
3	2		6				i
4	12	*	11				i
5	i		!	i		!	!

D. le 6.3.68 -18

Année / 1969
Emplacement . II 1058 Désignation Madeleine . Coline

1	! Nombre	! Datos	
	total	H3	1 !
1 1 %	sel		
1 2	4	13 × 1 1 1	
1 3 8	able		1 1
4	12	12 x 1 1 1	
1 5	12		! ! !

D. le 17-3-69

Année: 1970

Emplacement. 10 S8 Désignation Madeleine Celine

	Nombre Total!			DATE	ATES		
	d'yeux	MATERIAL	9-3	13.3	18:3	!	
1	! f	!		1	! !		
2	4		0	10	20 4	i	
3	. 2	•	1	11 4	21	!	
4	1						
5	19		0	0	14	i	

0018-3.70. -9

Designation :

0

Maseleine Céline

Clos II Planche 10 Côte S Rang 8 Souche 1 3 4 5

(A) BOURGEOINE ENT.

Colonne

- 41 epanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 seteux 5 velouté 6 araneeux 7 auveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à lisere carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU FAUT.

étolées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 seteuses 5 veloutées 6 aranéeuses (7)
 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche U fauves ou rousses l carnincess à liser, cormine s cuivress 4 jaunes 5 à ploges bronzees 6 entièrement bronzees 7 vertes E autress.

Dans le cas où la première feuille detaches est à lisere carmine, la couleur de la .º et de la 5° feuille detaches sere notés.

-Calvo 68

Nº ordre

Désignation: Mateleine Céline

Clos II Planche 10 côté S rang 8 souche I 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7.)
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7)

à limbe plan ()- en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux Dley duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 6 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
 - entièrement I partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Calu 68

Madeleure Celine ...

Désignation :

Emplacement: VI 10 5 8 2.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré () - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 12- à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7- à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte O - jaune 2 - rouge clair Gilbuse rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré Oligvert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Désignation: Madeleine Celine

Emplacement: II 1088' A.3

FEUILLE ADULTE.

colonno

34 - petite 1 - novenne 2 grande 3.

Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan O- on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5.

Lobos: plan 0- on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5.

36 - Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 fayes

37 - Wervures: Face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 centièrement rouge 4.

Face inférioure : verte 1 - partiellement rouge ontièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plonbé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyon (2) court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 - totalement 8.

40 - aranéoux 4 - duvetoux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré 2 autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo to

Emplacement : Désignation :

Madeleine Celine

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 6.

25 - A pédonculo horbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAID

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant () non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle
- 30 A saveur neutre 6 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenn court 3
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident 1) peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 6
- 33 Do séparation facile (égreneuse) (difficile 2.

Calvo

EMPLACEMENT : III 40 58 4.2 SARMENT DE VIGNE Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2) Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniformo (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1) brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1) poffacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Madeleine Coline

DENOMINATION :

Calvo 70

```
Emplacement: VT 10 S8
8 - Angle des nervures ..... 1 -(2)- 3.
10 - L2/L ..... 1-2.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - (7 - (9.)
12 - S. Lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3,
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3,
14 - S. pét. (forme) ...... 1 -(2)-(3)-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. ..... (1) - (2) - (3)
19 - Base nerv. (gar. au dég.) ..., 1 - 2 - 3
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.
                1 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                Direction : 1 - (2) - (3)
                Forme : 4 - 5.
                Médiane/Base : 6 - 7 - 8,
```

No d'ordre :

Origine :

ni Désignation: Madeleine Celine

Formulaire de description 1/8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2008

Code cépage : 0-653 Nom introduction: Madeleine Céline

Code introduction:

Emplacement: 4K8 0 61- 65

Observateur:

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal: le 11 3 Femilles que d'étalées - MD 226/2 = D1 -2.3 le 17/3 h. Etalées 10 1-2-3 parage le 20/3 écart de disprit prieno Très marqui 11-2-3 1 4.7

				The a mily second		
	Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
	1	4		Estimation 26/2	5	
	2	H		du 26/2 26/2	0	
	3	5		26/2	4	
1	pas encon	DE le 11/3		17/3	3 faxiation	0
	5	8		4/3	16	
	Moyenne	27		4/03	28	10
				-		

Date de floraison Taux de Date de véraison Date de Début début moitié nouaison début moitié maturité aoûtement (oiv 302) % (oiv 501) (oiv 303) (oiv 304) (oiv 306) 13/05

Of Tproductofos jas taut a fait TIF le 16/5 ong . 05, 4 MF DA. 3 EILS

Plus de Sarcs

I.N.R.A. - Domaine de Vassal - version 2003

fde 8 1.2.3

Formulaire de description 1/8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

3515

Année: 2009

Observateur:

Code cépage :

Code introduction: 0Mtp653

Nom introduction: Madeleine Celine

Emplacement: Vass4R08s061-065

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

12/05 gg Po Viville

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	1 5		2/3	8	
2	5		2/3	0	
3	5		2/3	0	
4	6	2/3	12/3	0	
5	8	9/3	1613	6	
Moyenne			7/3 -10		Pos représentatif

The same of the sa	Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)

Formulaire de description 1/8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2015

Observateur:

CodeVar: 3515 CodeIntro: 0Mtp653

Nom Var: Madeleine Céline

Emplacement: Vass4R08s061-065

	Pi	HENOLOGIE				10
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge

VIGUEUR ET CROISSANCE vigueur rameaux (floraison) très faible. Faible Moyenne Forte Très forte croissance prompts-bourgeons (avant absent ou Oiv 352 Faible Moyenne Forte Très forte rognage, ou maturité) très faible. RESISTANCE

très faible ou élevée ou Oiv 459 Degré de résistance Botrytis grappe moyenne faible très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	1				
2	, 4		10/3 60/32	(4) 1 , souther A	le
3	3		12/3	1 ptiti.	
4	DA Morte.		\	2 ermeon pusies	
5	8	12/3 366	24/3 @ 20/3 (3 d/avis)	3	
Moyenne	15		15/03_13	5	3

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
15/05	22/5-2		2/07	6/07-1		

15/05 I flows ow se morningle. De trispoche DS 18/5 & Deine Plo. Capular ford westers

2/07 = 02 0A mais fails pls physio. + tardine 05 raste spelit G(Shair) and is sont les prejellon no antropourts 02/07/15 qq. bais o belandissent

6/07 = baies molles + devonues + randuide

SUIVI DE MATURITE

Dates	3.08	10.8	The Earliest
IR	13,8	150	
Valeur papier PH		J	

Remarque:

Formulaire de description 2/8

(stade floraison)

Année: 2008

Code cépage: 0Mtp653

Code introduction:

Nom introduction: Madeleine Celine

Observateur:

Emplacement: Vass4R08s061-065

Bourgeonnement

oiv 001 forme: globuleuse 3 - demi-ouverte 5 - ouverte 7/.

oiv 002 distribution pigmentation anthocyanique: absente 1 - en liseré 22 partout 3.

oiv 003 intensité pigmentation anthocyanique : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 forte 7 - très forte 9.

oiv 004 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 forte 7 - très forte 9. oiv 005 densité poils dressés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Jeunes feuilles

oiv 051 couleur face supérieure (4° feuille détachée) : verte 1/2 - jaune 2 - plages bronzées 3 cuivrées rougeâtre sur toute la surface 4.

oiv 053 densité poils couchés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1) faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 054 densité poils dressés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 15- faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 055 densité poils couchés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1- faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 056 densité poils dressés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Vassal:

Jeunes feuilles du haut (3 premières détachées)

Profil: étalées 1 - en gouttière 2 - autre 3.

Densité poils couchés face inf. :nulle ou très faible 299 - faible 202 - moyenne 203 - très forte 204.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 280 - moyenne 200 - très forte 201.

Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1) - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Couleur face sup. : blanc 205 - fauve roux 206 - carminé 207 - liseré carminé 208 - jaune 209 plages bronzées ou cuivrées 210 - vertes 212 - autre 213.

(Dans le cas où la 1° feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° feuille détachée sera notée :)

Jeunes feuilles du bas (3 suivantes) Profil: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 285 - faible 223 - moyenne 224 - très forte 225.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 284 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés nervures face inf. : nulle ou très faible 283 - faible 217 - moyenne 218 très forte 219.

Densité poils dressés nervures face inf. : nulle ou très faible 282 - moyenne 215 - très forte 216. Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Couleur face sup. : blanc 226 - fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune 230 plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vertes 233.

Formulaire de description 3/8

(stade floraison)

Année: 200 8

Code introduction: 0Mtp653

Observateur: 7 D

Code cépage:

Nom introduction: Madeleine Celine

Emplacement: Vass4R08s061-065

Rameau herbacé

oiv 006 port : érigé 1 - demi-érigé 3 - horizontal 5 - demi-retombant 7 - retombant 9. oiv 351 vigueur rameaux : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 007 couleur face dorsale entrenoeuds: verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 009 couleur face dorsale noeuds : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 008 couleur face ventrale entrenoeuds : verte verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 010 couleur face ventrale noeuds : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 014 densité poils couchés entrenoeuds : nulle ou très faible 1 - moyenne 5 - forte 9.

oiv 012 densité poils dressés entrenoeuds : absence 1 - présence 9.

oiv 013 densité poils couchés noeuds : nulle ou très faible 1 - moyenne 5 - forte 9.

oiv 011 densité poils dressés noeuds : absence 1) - présence 9.

oiv 015 pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 016 distribution vrilles: discontinue (2 ou moins) 12 subcontinue ou continue (3 ou plus) 2. oiv 017 longueur vrilles: très courtes (<10cm) 1 - courtes (15cm) 3 - moyennes (20cm) 5 - longues (25cm) 7 - très longues (>30cm) 9.

Inflorescence

oiv 151 sexe de la fleur : mâle 1 - mâle à hermaphrodite 2 - hermaphrodite 3 - femelle à étamines érigées 4 - femelle à étamines reflexes 5.

oiv 152 niveau insertion 1° inflorescence: jusqu'au 4° noeud/1 - au-delà du 4° noeud 2.

oiv 153 nombre inflorescence/rameau: 1 ou moins \$\mathcal{V}\$- 1,1 à deux 2 - 2,2 à trois 3 - plus de trois 4. oiv 155 inflorescence sur rameaux issus des 3 yeux de la base : absence 1 – présence 9.

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

Vassal:

Surface du rameau herbacé : unie 1 - côtelée 2)

000-10 Villosité spéciale du rameau herbacé : épines ou analogues 1 - poils massifs 2 -aucune/3.

000-21 Couleur des vrilles : jaune 1 − rouge clair 2 − rouge foncé 3 − vert 🛝

Bouton floral: petit 1 - moyen 2 - gros 3.

Formulaire de description 4/8

Observation entre stades de nouaison et de véraison

Année:

Code cépage : 200 Y

Nom introduction: Madeleine Celine

Code introduction: 0Mtp653

Observateur: TD

Emplacement: Vass4R08s061-065

LIMBE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 065	Taille	Très petite	Petite	Moyenne	Grande	Très grande
Oiv 067	Forme du limbe	1-Cordiforme	2-Cunéiforme	3-Pentagon.	4-Orbicul.	5-Rénif.
Oiv 068	Nombre de lobes	1-F. entière	2-Trois	3-Qing	4-Sept	5- + de sept
Oiv 069	Couleur face supérieure limbe		Vert clair	Vert moyen	Vert toncé	
Oiv 070	Pigmentation anthocyanique (rouge) des nervures, face supérieure	(1) Nulle	2- Point pétiolaire	3- Jusqu'à 1 ^{ère} bifurc.	4- Après 1 ^{ère} bifurc.	
Oiv 071	Pigmentation anthocyanique (rouge) de nervures, face inférieure	1- Nulle	2) Point pétiolaire	3- Jusqu'à 1 ^{ère} bifurc.	4- Après 1 ^{ère} bifurc.	
Oiv 074	Profil du limbe	D Plan	2-En V	3-Involuté	4-Révoluté	5-Tourmenté
Oiv 073	Ondulation du limbe (entre nerv I ou II)	Absente				Présente
Oiv 072	Gaufrure du limbe (dépression entre nervures I et II)	Absente				Présente
Oiv 075	Cloqûre du limbe, face sup. (relief entre nervures de dernier ordre)	Nulle à t. fb.	Faible	Moveme	Forte	Très forte
Oiv 084	Densité p. couchés entre nerv. face sup.	Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 085	Densité p. dressés entre nerv. face inf.	Nulle at. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 086	Densité p. couchés des nerv. face sup.	Nulle à t. fb.	Fable	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 087	Densité p. dressés des nerv. face inf.	Nulle at. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 088	Villosité couchée nerv.principales face sup	Absente				Présente
Oiv 089	Villosité dressée nerv. principales face sup	Absente				Présente
Vassal	Densité p. couchés limbe face sup.	Nulle at. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Vassal	Densité p. dressés limbe face sup.	Nulle at. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

PETIOLE

Oiv 090	Densité poils couchés	Nulle a Rfb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 091	Densité poils dressés	Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 093	Longueur pétiole p/r nervure médiane	Beaucoup plus court	Plus court	Égal	Plus long	Beaucoup plus long

SINUS PETIOLAIRE (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7)

	Ouverture	1-très ouvert	25-)ouvert	3- peu ouvert		5- lobes chevauchants	6- lobes très chevauchants	
	Forme de la base		1- en U	2- en accolade	3- en V			
	Dent sur le bord		Absence	2- Présence assez fréquente de 1 ou 2 dents				
Oiv 81-2	Base dégarnie		1 Absence	2- sur 1 côté	3- sur 2 côtés			

SINUS LATERAUX SUPERIEURS (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7)

Oiv 082	Ouverture	1- absence de sinus	2- ouverts	3- fermés	4- lobes très chevauchants	
Oiv 83-1	Forme	1- 9h U	2- en accolade	3- en V		
Oiv 83-2	Dent	1) Absence	2- Présence fréquente			

DENTS (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7)

Oiv 076	Forme	1- côtés concaves	2-côtés recyllignes	3- notations 2 + 4	4- côtés convexes	5- un côté concave et l'autre convexe
Oiv 077	Taille	Très petites	Petites	Moyennes	Grandes	Très grandes
Oiv 078	Rapport longueur/largeur	Très courtes	Courtes	Moyennes	Longues	Très longues

AUTRE CARACTERE OBSERVABLE A CETTE PERIODE

Oiv 501	Taux de nouaison (7 à 14 j. après flor.)	Très faible	Faible	Moyen	Élevé	Très élevé	
Part Lance		(<10%)	(11-30%)	(31-50%)	(51-70%)	(>80%)	

Formulaire de description 5/8

(stade maturité)

Observateur: Année: 9008 Code introduction: 0Mtp653 Code cépage: Emplacement: Vass4R08s061-065 Nom introduction: Madeleine Celine Grappe oiv 202 longueur: très courte (<10 cm) 1 - courte (10-14 cm) 3 - moyenne (14-18 cm) 5 longue (18-25 cm) 7 - très longue (>25 cm) 9. Valeur absolue (en cm.): oiv 203 largeur: très étroite (<5 cm) 1 - étroite (5-10 cm) 3 - moyenne (10-15 cm) 5 -Valeur absolue (en cm.): 7 large (15-20 cm) 7 - très large (>20 cm) 9. oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9. oiv 206 longueur pédoncule : très court (<3 cm) 1 - court (3-5 cm)(3 - moyen (5-7 cm) 5 long (7-10 cm) 7 - très long (>10 cm) 9. oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement 1 - moitié 5 - plus de la moitié 7. oiv 208 forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2 - en entonnoir 3. oiv 209 présence d'un aileron : absent 1 - une à trois ailes 2 - plus de trois ailes 3. Baie oiv 220 longueur: très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue (20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9. Valeur absolue (en mm.): 16 oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9. Valeur absolue (en mm.): 15~ oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme/1) - uniforme 3. oiv 223 forme : aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 cylindrique 7 - arquée 8. oiv 225 couleur épiderme : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6. oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2. oiv 227 pruine: nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 - très épaisse 9. oiv 229 **ombilic**: peu apparent **1** - apparent **2**. oiv 230 coloration de la pulpe : non colorée 1 - colorée 2. oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée 1 - coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9. oiv 232 succulence pulpe: peu juteuse 1 - juteuse 2. oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7. oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9. oiv 236 saveur : aucune 1 - goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - autre 5. oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm)(1) - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9. oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9. oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3. oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9. 6 oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9. oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes 1\- présentes 2. Vassal: 000-11 axe de la rafle de la grappe : non coloré 2 - coloré 1.

000-18 région ombilicale : déprimée 1 – non déprimée 2.

Millerandage: nul à très faible 1 – faible 3 – moyen/5 – fort 7 – très fort 9.

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année : 2008 Code introduction: 0Mtp653

Nom introduction: Madeleine Celine Emplacement: Vass4R08s061-065

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.

Code cépage:

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 40

oiv 104 lenticelles : absentes 1 - présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds : absence T - présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenœuds : absence 4 - présence 9.

oiv 351 vigueur * : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons: très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue : 100 ~

TD

Observateur:

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3)- moyen (11mm) 5 -

grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Valeur absolue : _ 8 ~

Suppléments pour Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

Pruine sur sarment : absence 1 – partiellement présente 2 – présente 3.

^{*} voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »